

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Satış Numarası :
Rahatsız Tarihi ve Numarası : 19.10.2009 / 7290

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU
Patates	Kahböğazi Nekroza ve Sivri Sığıl Hastalığı (<i>Rhizoctonia solani</i>)	17,5 ml/100 kg tohum

BİTKİ KORUMA ÖRÜNÜNÜN UYGULANMAYA HAZIRLANMASI:

Tohumluk patatesler diz bir zemin üzerine yayılır. 100 kg tohumluk önerilen ortalık miktarı bir kova içindeki suya ilave edilip iyice karıştırılarak patilervatöre aktarılır. Hazırlanan karışım tohumluk patateslerin üzerine önce yarırsı püskürtülerek patatesler karele ters yüz edilir. Sonra ortalık kalan yarırsı püskürtülerek uygulama tamamlanır. Uygulamada dikkat edilecek husus, su miktarının tohumluğu ısıtacak fakat akmayacak miktarda olmasıdır. Uygulamadan hemen sonra ekim yapılabileceği gibi, tohumlukların nemli kuruduktan sonra güvullenerek veya dikime olarak birkaç gün beklenebilir. Uygulama güvullenme ve dikim sırasında lastik eldiven giyilmelidir.

KALIBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar Uygulamalar güdüden serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

HAZIRLANMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sisteminin çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltınız.

19 Haziran 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

AMC-TR TARIM SAN. ve TİC. A.Ş



AMC-TR

MONCUT® 40 SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

464 g/L Flutolanil

GRUBU C2: 7 FUNGİSİT (Manar İlaç)

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ
EVDE KULLANMAYINIZ

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN
UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÖRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA
HIÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARZA
KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÖRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYVA 1 GÜN
İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK
İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKLİNDE VE TAVSİYE EDİLDİĞİ
DOZDA KULLANINIZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÖRÜNLER DİŞİNDE
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

**KULLANILAN ÖRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE
İ/ÖNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ
ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ.
BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Gözde hafif tahriş. Toz, solunum sisteminde tahrişe neden olabilir.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

Net Miktar
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Flutolanil

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (B)

H411: Sıcak ortamda uzun süre kalma, toksik etki
EUH208: (1,2-benzisothiazolin-3-one) içeren Alerjik
reaksiyona yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P273: Çevreye verilmemesinden kaçınma
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/
yüz koruyucu kullanın.
P391: Döküntüleri toplayın

P501: İçerdiği/kalıp bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri
önllemek için kullandığı talimatlarına uyun.


**KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR :**

- * Airlara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- * Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- * Bahçalara ve suda yaşayan canlılara zehirlidir.
- * Kullanılmış boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız.
- * BKÜ'nü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- * Boş kapları usulüne uygun olarak imha ediniz.

Burhan ŞİMŞEK
Ziraat Mühendisi

AMC-TR TARIM
SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Çağlayan Mah. Bernaklar Bulvarı
Sıdıklı Etiler Apt. No: 41/2 ANTALYA
Tel: 0 242 324 13 15 Faks: 0 242 324 19 69
KURUMLAR V.D.: 781 019 6358



BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Sıvı ilaçlama düzeneğine sahip selektörlerle de uygulama yapılabilir. İdeal su miktarı tohumu iyi bir şekilde kaplayan fakat aktımayan miktardır. Kalibrasyon yapıldıktan sonra gerekli miktar ürün, gerekli miktar su ile iyice karıştırılır. İlaçlama düzeneğinin deposuna konarak uygulama yapılır. Uygulanmadan sonra çuvallanacak olan ilaçlı tohumun tamamen kurumuş olduğundan emin olunmalıdır. Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

MONCUT 40 SC adı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup C2:7** olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **MONCUT 40 SC**'nin aynı üretilim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmamızdır. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip **(Grup C2: 7 haricinde)** bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARISILIBİLİRLİK DURUMU:

Thiamethoxam ve İmidacloprid içerikli tohum ilaçları ile karıştırılabilir.

AMC-TR TARIM SAN. VE TİC. A.Ş



MONCUT® 40 SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU	C2: 7	FUNGİSİT (Manar İlaç)
-------	-------	-----------------------

464 g/l Flutolanil

ILKYARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz: Gözleri, göz kapakları açık bir şekilde 15-20 dk boyunca zaman zaman alt ve üst göz kapaklarını kaldırarak bol miktarda su ile yıkayın. Gerekirse doktora başvurun. **Cilt:** Vücut ünlle temas ederse bol su ve sabun ile 15-20 dk yıkayın ve uygun bir cilt temizleyicisi kullanın. **Kirli giysileri** akan su altında hemeni çıkartın. Yeniden kullanmadan önce giysileri yıkayın. Gerekirse doktora başvurun **Yutma:** Ürün yutulmuş ise hastanın ağzını bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. **Doktor tarafından söylenmedikçe hastayı KUSTURMAYIN.** Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağzdan bir şey vermayın. Tıbbi destek alın. **Solunum:** Etkilenen kişiyi temiz havaya çıkartın. Solunum durmuş veya yavaşlamış ise suni solunum uygulayın, tasmaak için sabit bir yan pozisyona getirin. Gerekirse oksijen takviyesi yaparak en yakın sağlık kurumuna sevk edin. Hastada bilinç kaybı görülürse tıbbi yardım isteyin.

ANTİBOTU VE TEDAVİSİ:

Herhangi bir antitodu yoktur. Semptomatik olarak tedavi edilir.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda, orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile;imalatçı bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. İmalatçı bitki koruma ürününün hatalı depolanması, hatalı tatbiki veya taşıyıcı uyumundaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmez. 2 yıl süreyle spesifikasyonuna uygunluğunu garanti eder.

ÜRETİCİ FİRMA:

NICHINO EUROPE CO., LTD
5 Pioneer Court, Vision Park, Histon Cambridge
CB24 9PT INGL. TERE
ÜRETİM TESİSİ:
SAFAPAC
4 Stapledon Road, Orton Southgate, Peterborough
PE2 6TB INGL. TERE

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AMC-TR Tarım San. ve Tic. A.Ş.
Çağlayan Mah. Barnaklar Bulvarı Sıdka Polar Apt.
No: 41 / 2 ANTALYA - TÜRKİYE www.amc-tr.com
Tel: + 90 242 324 13 15 Fax: + 90 242 324 19 69

Burhan ŞİMŞEK
Ziraat Mühürhaneçisi

AMC-TR TARIM
SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Çağlayan Mah. Barnaklar Bulvarı
Sıdka Polar Apt. No: 41/2 ANTALYA
Tel: 0 242 324 13 15 Faks: 0 242 324 19 69
KURUMLAR V.D.: 781 019 6358

19 Haziran 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

